



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 103

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria – recante “Consigli per i viaggi internazionali in relazione alla situazione epidemiologica del morbillo e all’Avviso dell’OMS del 20 giugno 2019”.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la nota del Ministero della salute indicata in oggetto (All. n. 1).

Nella suddetta nota si rileva che l'OMS raccomanda ai viaggiatori internazionali:

- “di verificare che il proprio stato vaccinale sia coerente rispetto al calendario nazionale e ai rischi potenziali associati ai luoghi di viaggio, e di assicurarsi, in particolare, di aver ricevuto due dosi di vaccino contro il morbillo;
- se non si è sicuri del proprio stato immunitario nei confronti del morbillo o non si è stati vaccinati in precedenza, di ricevere almeno una dose di vaccino anti-morbillo almeno 15 giorni prima del viaggio;
- che i bambini non vaccinati ricevano almeno una dose di vaccino contro il morbillo se viaggiano in paesi o aree con focolai di morbillo. I bambini di età compresa tra 6 e 9 mesi che ricevono una dose di vaccino contro il morbillo dovranno successivamente sottoporsi al ciclo vaccinale completo a due dosi di vaccino contro il morbillo, alle età previste dal Calendario vaccinale nazionale;
- di rivolgersi al proprio medico per avere maggiori informazioni sulla malattia.

Il vaccino contro il morbillo può essere somministrato in concomitanza con altri vaccini raccomandati per i viaggiatori, come quello contro la febbre gialla”.

Si invitano gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



All. n. 1

MF/AM

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE

A

Assessorati alla Sanità Regioni
Statuto ordinario e speciale

Assessorati alla Sanità Province
Autonome Trento e Bolzano

U.S.M.A.F. – S.A.S.N.

Direzione Generale della programmazione
sanitaria

Direzione Generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali

AIFA
direzione.generale@pec.aifa.gov.it

Ministero della difesa
Stato maggiore della difesa
Ispettorato generale della sanità
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero degli Affari Esteri
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Azienda ospedaliera - polo universitario ospedale
Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

Comando carabinieri tutela della salute – NAS
sede centrale
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Croce rossa italiana
comitato.nazionale@cert.cri.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Gruppo tecnico di monitoraggio per il
coordinamento operativo del Piano nazionale per
l'eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita

Commissione Nazionale di Verifica
dell'eliminazione del morbillo e della rosolia

OGGETTO: Consigli per i viaggi internazionali in relazione alla situazione epidemiologica del morbillo e all'Avviso dell'OMS del 20 giugno 2019.

Il morbillo è una delle malattie più contagiose al mondo, associata al rischio di sviluppare quadri clinici anche molto gravi, fino al decesso. Nel 2017 i decessi causati da morbillo sono stati circa 110.000. Anche nei paesi ad alto reddito, le complicanze da morbillo (tra cui cecità, encefalite e danni cerebrali, grave diarrea e relativa disidratazione, infezioni dell'orecchio con possibile perdita dell'udito o infezioni respiratorie come la polmonite) comportano il ricovero in ospedale fino a un quarto dei casi e possono portare a invalidità permanente. In Italia, il dato dei ricoveri ospedalieri, che emerge dal sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia, è più allarmante: dall'1 gennaio al 31 maggio 2019, su 1.096 casi di morbillo segnalati in Italia, il 44,9% è stato ricoverato e un ulteriore 25,5% si è rivolto ad un Pronto Soccorso (https://www.epicentro.iss.it/morbillo/bollettino/RM_News_2019_53.pdf). La maggior parte dei decessi correlati al morbillo sono causati da complicanze associate alla malattia.

Il primo segno di infezione da morbillo è di solito una febbre alta, che inizia circa 10-12 giorni dopo l'esposizione al virus e si protrae per un periodo di 4 - 7 giorni. Nella fase iniziale i sintomi possono essere naso che cola, tosse, occhi rossi e lacrimosi, piccole macchie bianche all'interno delle guance. Dopo diversi giorni si manifesta un'eruzione cutanea, solitamente sul viso e sul collo.

La migliore protezione contro la malattia è la vaccinazione con due dosi, somministrate ad almeno 4 settimane di distanza l'una dall'altra.

Rischio di infezione per i viaggiatori internazionali

Negli ultimi mesi si sono verificati picchi nel numero dei casi, anche in paesi con una copertura vaccinale elevata, in quanto la malattia si è diffusa rapidamente nei gruppi di non vaccinati.

Il virus del morbillo si diffonde da persona a persona attraverso la tosse e gli starnuti, per contatto diretto con le secrezioni nasali o della gola di persone infette o per contatto con oggetti contaminati da queste secrezioni. Il virus, infatti, rimane attivo e contagioso nell'aria o su superfici infette fino a 2 ore. Può essere trasmesso da una persona infetta da 4 giorni prima a 4 giorni dopo la comparsa dell'eruzione cutanea. I bambini non vaccinati sono a più alto rischio di morbillo e delle sue complicanze. Qualsiasi persona non immune (cioè che non ha avuto la malattia e non è stata vaccinata con 2 dosi di vaccino contro il morbillo) può essere infettata.

Raccomandazioni per i viaggiatori internazionali

In caso di viaggio, l'OMS raccomanda:

- di verificare che il proprio stato vaccinale sia coerente rispetto al calendario nazionale e ai rischi potenziali associati ai luoghi di viaggio, e di assicurarsi, in particolare, di aver ricevuto due dosi di vaccino contro il morbillo;
- se non si è sicuri del proprio stato immunitario nei confronti del morbillo o non si è stati vaccinati in precedenza, di ricevere almeno una dose di vaccino anti- morbillo almeno 15 giorni prima del viaggio;
- che i bambini non vaccinati ricevano almeno una dose di vaccino contro il morbillo se viaggiano in paesi o aree con focolai di morbillo. I bambini di età compresa tra 6 e 9 mesi che ricevono una dose di vaccino contro il morbillo dovranno successivamente sottoporsi al ciclo vaccinale completo a due dosi di vaccino contro il morbillo, alle età previste dal Calendario vaccinale nazionale;
- di rivolgersi al proprio medico per avere maggiori informazioni sulla malattia.

Il vaccino contro il morbillo può essere somministrato in concomitanza con altri vaccini raccomandati per i viaggiatori, come quello contro la febbre gialla.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.

Referenti:

Dr.ssa S. Iannazzo (int. 3836)

Responsabile SI-Programmi di Vaccinazione, AMR e ICA

Dr.ssa M. Sabbatucci (int. 3665)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 5

*F.to Francesco MARAGLINO

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"